EQUAZIONI
 $f(x) = 0$

DISEQUAZIONI
 $f(x) > 0$

FUNZIONI
 $y = f(x)$

INTERSEZIONE $\cap$ → Parti in comune

UNIONE $\cup$ → Tutto insieme

STUDIO DEL SEGNO ($> < \geq \leq$) → Prodotto dei segni

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI TRASCENDENTI DI TIPO ELEMENTARE

ANALISI DEL GRAFICO DELLE FUNZIONI

Y_p è **IMMAGINE** di X_{p1}
 X_{p1} , X_{p2} e X_{p3} sono **CONTROIMMAGINI** di Y_p

sono
 relazioni che associano ad ogni elemento $x \in \mathbb{R}$ di un insieme chiamato **DOMINIO**, uno ed un solo elemento $y \in \mathbb{R}$ di un insieme chiamato **CODOMINIO**
 si rappresentano
 • Analiticamente: $y = f(x)$
 • Graficamente: in uno spazio cartesiano

Numero di controimmagini

- INIETTIVA**
ogni Y è immagine di massimo una X
- SURIETTIVA**
ogni Y è immagine di almeno una X
- BIETTIVA**
Ogni Y è immagine di una e una sola X

STUDIO DEL GRAFICO

DOMINIO	SIMMETRIE	INTERSEZIONI CON GLI ASSI	SEGNO	ASINTOTI	MONOTONIA	CONCAVITA'
<p>Per quali valori di x la funzione esiste?</p> <p>$(0; +\infty)$ $\forall \epsilon \in \mathbb{R} x > 0$</p>	<p>FUNZIONE PARI simmetrica rispetto all'asse Y $f(-x) = f(x)$</p> <p>FUNZIONE DISPARI Simmetrica rispetto all'origine $f(-x) = -f(x)$</p>	<p>Intersezioni con l'asse x $I_{x1}(x_1; 0)$ $I_{x2}(x_2; 0)$ $I_{x3}(x_3; 0)$</p> <p>Intersezioni con l'asse y (al massimo una) $I_y(0; y)$</p>	<p>Per quali valori di x la funzione sta sopra l'asse x?</p> <p>$- \quad + \quad - \quad +$</p>	<p>Rette alle quali la funzione si avvicina sempre di più, senza mai toccarle</p> <p>VERTICALI e ORIZZONTALI $y = l$ $x = d$</p> <p>OBLIQUI $y = mx + q$</p>	<p>CRESCENTI $x_1 > x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ $\frac{\Delta y}{\Delta x} > 0$</p> <p>DECRESCENTI $x_1 > x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ $\frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$</p> <p>$P_{max}$ P_{min} X_{max} X_{min}</p>	<p>La funzione è rivolta verso l'alto o verso il basso?</p> <p>Concavità positiva (+)</p> <p>Concavità negativa (-)</p> <p>P_{flesso} X_{flesso}</p>

DISEGNO DELLE FUNZIONI

Polinomiali (interi)	Irrazionali	Funzione omografica (fratta)	Logaritmiche	Esponenziali	Trigonometriche
<p>Asintoto verticale: $x = -\frac{d}{c}$ Asintoto orizzontale: $y = \frac{a}{c}$</p>
$y = x$ $y = x^2$ $y = x^3$	$y = \sqrt[3]{x}$ $y = \sqrt[3]{-x}$	$y = \frac{ax + b}{cx + d}$	$y = \log_2(x)$ $y = \log_{0,1}(x)$	$y = 2^x$ $y = 0,2^x$	$y = A \sin(\omega x)$ $y = A \cos(\omega x)$ $y = \tan(\omega x)$

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{\pi}{\omega}$$

TRASLAZIONI

LUNGO L'ASSE x $y = f(x \pm a)$

LUNGO L'ASSE y $y = f(x) \pm c$

ROTAZIONI

ATTORNO ALL'ASSE x $y = -f(x)$

ATTORNO ALL'ASSE y $y = f(-x)$

VALORE ASSOLUTO

VALORE ASSOLUTO DELLA FUNZIONE

VALORE ASSOLUTO DELLA x

DILATAZIONI

AUMENTO SULLA x $y = f(b \cdot x)$

AUMENTO SULLA y: $y = b \cdot f(x)$

CALCOLO DEI LIMITI

METODO 1: raccogliere le x di grado più alto e semplificare

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 4x^2}{-2x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x^2} \left(\frac{3}{x} + 4 \right)}{\cancel{x^2} \left(-2 + \frac{1}{x^2} \right)}$$

METODO 2: confrontare l'ordine di infinito

grado N > grado D → Risultato: ∞

grado N < grado D → Risultato: 0

grado N = grado D → Risultato: rapporto coefficienti grado più alto

Scomporre i polinomi e semplificare:

- Calcolatrice $(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)...$
- Prodotti notevoli

$$A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$$

$$A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$$

$$A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)$$

- Ruffini

$$x^3 + 2x^2 + x + 2$$

1	2	1	2
	+	+	+
-2	-2	-2	0
1	0	1	0

$$x^3 + 2x^2 + x + 2 = (x + 2)(x^2 + 1)$$

Il risultato è determinato dal termine che va ad infinito più rapidamente

ESPOENZIALE

POTENZA

LOGARITMO

Metodo di De L'Hopital:
Attendi il prossimo anno...

LA CONTINUITA'

Una funzione è continua se:
In ogni punto il limite destro e sinistro coincidono e danno un valore finito che appartiene al codominio della funzione

Funzione con discontinuità in $x = d$

Che tipo di discontinuità?

1° specie: SALTO

$$\lim_{x \rightarrow d^+} f(x) = L_1$$
$$\lim_{x \rightarrow d^-} f(x) = L_2$$

$$L_1 \neq L_2$$

2° specie: ASINTOTO VERTICALE

$$\lim_{x \rightarrow d^+} f(x) = \pm\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow d^-} f(x) = \pm\infty$$

3° specie: ELIMINABILE

$$\lim_{x \rightarrow d^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow d^-} f(x) = L$$

STUDIO DI FUNZIONE

DOMINIO

In quale parte dell'asse x la funzione esiste?

- denominatore $\neq 0$
- radicando ≥ 0
- argomento del logaritmo > 0
- argomento della tangente $\neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$(-\infty; x_1] \vee (x_1; x_2)$$

SIMMETRIE

La funzione è pari o dispari?

Funzione PARI
Simmetrica rispetto all'asse y

$$f(-x) = f(x)$$

Funzione DISPARI
Simmetrica rispetto all'origine

$$f(-x) = -f(x)$$

INTERSEZIONI

La funzione interseca i due assi?

Intersezioni con l'asse x

$$I_x = \begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow f(x) = 0$$

Intersezione con l'asse y (massimo 1)

$$I_y = \begin{cases} y = f(x) \\ x = 0 \end{cases}$$

SEGNO

In quali parti la funzione è positiva e in quali è negativa?

$$f(x) > 0$$

ASINTOTI

Ci sono rette a cui la funzione si avvicina senza mai toccarle?

$$(-\infty; x_1] \vee (x_1; +\infty)$$

ASINTOTI VERTICALI

Si cercano nelle discontinuità del dominio

$$(-\infty; x_1] \vee (x_1; +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1^\pm} f(x) = \pm\infty$$

Se il risultato è $\pm\infty$ allora c'è un asintoto verticale di equazione:

$$x = x_1$$

ASINTOTI ORIZZONTALI

Si cercano all'infinito (se il campo di esistenza non è limitato)

$$(-\infty; x_1] \vee (x_1; +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = k$$

Se il risultato è un numero k allora c'è un asintoto orizzontale di equazione:

$$y = k$$

ASINTOTI OBLIQUI

Si cercano solo se non ci sono asintoti orizzontali

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$

Se $m \neq 0$, allora si calcola q e l'asintoto obliquo ha equazione:

$$y = mx + q$$

MONOTONIA

Per quali intervalli dell'asse x la funzione cresce/decrece?

$$f'(x) \geq 0$$

$$P_{MIN}(x_{MIN}; f(x_{MIN}))$$

CONCAVITA'

Per quali intervalli dell'asse x la funzione è rivolta verso l'alto?

$$f''(x) \geq 0$$

$$P_F(x_F; f(x_F))$$